

2026.3.20.

# 새 학기 단체생활 중 ‘수두’ 전염 주의!

얼굴에 빨간 점 뭐야?



새 학기 단체생활이 늘어나면서  
**어린이집과 유치원, 학교에서  
수두가 집단 발생**하고 있어!



# 수두는 보통 14~16일 잠복기 후 미열과 발진, 무기력함, 물집이 나타나!



## 주요 증상



미열



발진



무기력함



물집

수두는 **물집에 직접 접촉**하거나  
**기침이나 재채기로 전염**될 수 있으니,  
**단체생활 시 주의가 필요해!**



수두, 어떻게 전염될까?

### 감염 경로



물집과  
직접 접촉



기침·재채기를 통한  
호흡기 전파

수두는 대부분 자연 회복되지만

**예방접종이 가장 효과적인 예방법**이고,  
**등원·등교를 하지 않는 것이 중요**해!

**수두, 예방접종으로  
미리 예방하자구!**



### 접종대상 및 시기

- ✓ **소아의 경우, 12~15개월에 수두 백신 1회 접종**  
\* 13세 이상 미접종자는 4~8주 간격 2회 접종
- ✓ **성인의 경우, 4~8주 간격 2회 접종**

슈도가 의심되면?  
등원·등교는 **NO!** 병원은 **GO!**

