




충청북도  
감염병관리지원단



# 백일해



24-25년 충북 백일해 신고 현황



겨울철 호흡기 질환 유행시기에  
백일해 발생이 많으므로  
주의가 필요합니다.

## 백일해란?

백일해균(*Bordetella pertussis*) 감염에 의한 급성 호흡기 질환입니다.

## 역학



- 호흡기 분비물이나 비말을 통한 호흡기 전파가 주된 전파경로입니다.
- 백일해의 전염성은 매우 높아서 가족 내 2차 발병률이 80%에 달합니다.
- 잠복기: 5 ~ 21일 (평균 7~10일)
- 전염기: 카타르기(약 1~2주)시작~ 발작성 기침 시작 후 3주까지 가능합니다. (또는 적절한 항생제 투여 시작 후 5일 까지)

## 백일해에 감염되면 어떻게 해야 하니까요?

- 학교, 어린이집 등 전파차단을 위해 전염기간(치료: 항생제 복용 5일, 미치료: 기침이 멈출때까지 최소 3주) 동안 등교, 등원은 중지하고 집에서 격리합니다.

## 치료

대증적 치료 및 항생제 치료를 합니다.



## 예방접종



- **접종대상 및 시기:** 모든 영유아 및 소아
- **기초접종:** 생후 2, 4, 6 개월 (DTaP 혹은 DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib)
- **추가 접종**
  - 생후 15~18개월 (DTaP)
  - 4~6세 (DTaP 혹은 DTaP-IPV)
  - 11~12세 (Tdap 혹은 Td)
  - 이후 Tdap 백신으로 매 10년마다 추가접종. 11세 이후 접종 중 한 번은 Tdap으로 접종해야 하며, 가능한 한 11~12세에 Tdap으로 접종