

수학 영역

나형 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40


해설

- [출제의도] 지수 계산하기
 $8^{\frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2$
- [출제의도] 등차수열 계산하기
 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $d = a_2 - a_1 = 5 - 3 = 2$
 $a_4 = 3 + 3 \times 2 = 9$
- [출제의도] 로그 계산하기
 $\log 10^3 = 3 \log 10 = 3$
- [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기
 $\tan \frac{5}{4}\pi = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$
- [출제의도] 호도법을 활용하여 부채꼴의 호의 길이 계산하기
 부채꼴의 호의 길이는
 $3 \times \frac{2}{3}\pi = 2\pi$
- [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기
 모든 실수 x 에 대하여 $-1 \leq \cos x \leq 1$
 $-1 \leq \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \leq 1$
 $-2 \leq 2\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \leq 2$
 $1 \leq 2\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 3 \leq 5$ 이므로
 함수 $f(x) = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 3$ 의 최솟값은 1
- [출제의도] 함수의 극한 이해하기
 $f(0) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$ 이므로
 $f(0) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 + 2 = 3$

8. [출제의도] 지수함수의 그래프 이해하기
 함수 $f(x) = 5^{x-2} + 3$ 은
 x 의 값이 증가함에 따라 함숫값이 증가한다.
 $\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은
 $f(3) = 5^{3-2} + 3 = 5 + 3 = 8$

9. [출제의도] \sum 의 성질을 활용하여 수열의 합 이해하기
 $\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) = 7, \sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 5$ 이므로
 $\sum_{n=1}^{10} \{(2a_n - b_n) + (a_n + b_n)\} = 7 + 5$
 $\sum_{n=1}^{10} 3a_n = 12$
 $\sum_{n=1}^{10} a_n = 4, \sum_{n=1}^{10} b_n = 1$ 이므로
 $\sum_{n=1}^{10} (a_n - 2b_n) = \sum_{n=1}^{10} a_n - 2 \sum_{n=1}^{10} b_n = 2$
 (다른 풀이)
 $\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) = 7, \sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 5$ 이므로
 $\sum_{n=1}^{10} (a_n - 2b_n) = \sum_{n=1}^{10} \{(2a_n - b_n) - (a_n + b_n)\}$
 $= 7 - 5 = 2$

10. [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기



$\sin x = \frac{1}{2} (0 \leq x \leq \pi)$ 이므로
 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5\pi}{6}$
 따라서 모든 해의 합은 $\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = \pi$

11. [출제의도] 수열의 합을 활용하여 문제 해결하기

$x_n = \frac{1}{2}(n^2 + 1)$ 이므로
 $\sum_{n=1}^8 \frac{1}{2}(n^2 + 1) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^8 n^2 + \sum_{n=1}^8 1 \right)$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{8 \times 9 \times 17}{6} + 8 \right)$
 $= 106$

12. [출제의도] 사인법칙을 활용하여 문제 해결하기
 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면
 사인법칙에 의하여
 $\frac{5}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2R$ 이므로 $R = 5$

13. [출제의도] 귀납적으로 정의된 수열의 항 추론하기

$a_1 = 3$
 $a_2 = a_1 + 3 = 3 + 3 = 6$
 $a_3 = 2a_2 = 2 \times 6 = 12$
 $a_4 = a_3 + 3 = 12 + 3 = 15$
 $a_5 = 2a_4 = 2 \times 15 = 30$
 $a_6 = a_5 + 3 = 30 + 3 = 33$

14. [출제의도] 등비수열의 성질 이해하기
 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면
 일반항 $a_n = ar^{n-1}$ 이므로
 $a_1 a_9 = a^2 r^8 = 16$
 $a_3 a_7 + a_4 a_6 = a^2 r^8 + a^2 r^8 = 16 + 16 = 32$


(다른 풀이)
 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 등비중항의 성질에 의하여
 $a_1 a_9 = a_3 a_7 = a_4 a_6 = (a_5)^2$ 이므로
 $a_3 a_7 + a_4 a_6 = 16 + 16 = 32$

15. [출제의도] 여러 가지 수열의 합 이해하기

$a_n = {}_{n+1}C_2 = \frac{(n+1)n}{2}$ 이므로
 $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$
 따라서
 $\sum_{n=1}^9 \frac{1}{a_n} = 2\left\{\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10}\right)\right\}$
 $= \frac{9}{5}$

16. [출제의도] 로그함수의 그래프 이해하기

$g(x) = \log_2 3x = \log_2 x + \log_2 3$
 $= f(x) + \log_2 3$ 이므로
 함수 $g(x) = \log_2 3x$ 의 그래프는
 함수 $f(x) = \log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로
 $\log_2 3$ 만큼 평행이동한 것이다.



점 $(3, 0)$ 을 E라 하자.
 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 선분 DB, 선분 BC로 둘러싸인 부분의 넓이는
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 선분 AE, 선분 EB로

둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

따라서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 선분 AD, 선분 BC로 둘러싸인 부분의 넓이는 사각형 AEBD의 넓이와 같다.

$$\overline{AD} = \log_2 3, \overline{AE} = 2 \text{ 이므로}$$

$$\text{넓이는 } 2 \times \log_2 3 = 2 \log_2 3$$

17. [출제의도] 로그의 성질을 활용하여 문제 해결하기

$$\log_n 4 \times \log_2 9 = \frac{\log 2^2}{\log n} \times \frac{\log 3^2}{\log 2}$$

$$= \frac{4 \log 3}{\log n}$$

$$= 4 \log_n 3$$

$4 \log_n 3 = m$ (m 은 자연수)이라 하자.

$$n = (3^4)^{\frac{1}{m}} \text{ 이므로}$$

$m=1$ 일 때, $n=81$
 $m=2$ 일 때, $n=9$
 $m=4$ 일 때, $n=3$
 따라서 모든 n 의 값의 합은
 $81+9+3=93$

18. [출제의도] 수학적 귀납법을 활용하여 추론하기

일반항이 $a_n = n^2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$(n+1)S_n - \sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n k^3 \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

- (i) $n=1$ 일 때,
 (좌변) $= 2S_1 - S_1 = 1$, (우변) $= 1$ 이므로
 (*)이 성립한다.
 (ii) $n=m$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면
 $(m+1)S_m - \sum_{k=1}^m S_k = \sum_{k=1}^m k^3$ 이다.
 $n=m+1$ 일 때 (*)이 성립함을 보이자.
 $(m+2)S_{m+1} - \sum_{k=1}^{m+1} S_k$
 $= (m+2)S_{m+1} - \left(\sum_{k=1}^m S_k + S_{m+1} \right)$
 $= \boxed{(m+1)} S_{m+1} - \sum_{k=1}^m S_k$
 $= (m+1)(S_m + a_{m+1}) - \sum_{k=1}^m S_k$
 $= \boxed{(m+1)} S_m + \boxed{(m+1)^3} - \sum_{k=1}^m S_k$
 $= \sum_{k=1}^m k^3 + (m+1)^3$
 $= \sum_{k=1}^{m+1} k^3$ 이다.
 따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.
 (i), (ii)에 의하여 주어진 식은
 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

$$f(m) = m+1, g(m) = (m+1)^3$$

$$f(2) + g(1) = 11$$

19. [출제의도] 지수함수의 성질을 활용하여 문제 해결하기

함수 $f(x) = a^{x-k}$ ($a > 0, a \neq 1$)이므로 조건에 의하여

$$f(2+x)f(2-x) = a^{2+x-k} \times a^{2-x-k}$$

$$= a^{4-2k} = 1$$

$$4-2k=0, k=2 \text{ 이므로}$$

함수 $f(x) = a^{x-2}$ ($a > 0, a \neq 1$)

$$\neg. f(2) = a^0 = 1 \text{ (참)}$$

$\hookrightarrow. 0 < a < 1$ 일 때,

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 1이다. (거짓)

$$\square. \{f(t+2) - f(t+1)\} - \{f(t+1) - f(t)\}$$

$$= f(t+2) - 2f(t+1) + f(t)$$


$$= a^t - 2a^{t-1} + a^{t-2}$$

$$= a^{t-2}(a^2 - 2a + 1)$$

$$= a^{t-2}(a-1)^2 > 0$$

이므로 $f(t+1) - f(t) < f(t+2) - f(t+1)$ (참)
 따라서 옳은 것은 \neg, \square

20. [출제의도] 삼각함수를 활용하여 문제 해결하기



반지름의 길이가 r_1 인 원의 중심을 C,
 선분 AP의 중점을 D라 하자.
 $\angle BAP = \theta$ 라 할 때,

$$\cos \theta = \frac{4}{5} \text{ 이므로 } \sin \theta = \frac{3}{5} \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

(i) $\angle BOP = 2\theta$ 이므로 $\angle BOC = \theta$

$$r_1 + \overline{OC} = r_1 + \frac{r_1}{\sin \theta} = 1$$

$$r_1 = \frac{\sin \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{3}{8}$$

(ii) $2r_2 + \overline{OD} = 2r_2 + \sin \theta = 1$

$$r_2 = \frac{1 - \sin \theta}{2} = \frac{1}{5}$$

$$\text{따라서 } r_1 r_2 = \frac{3}{40}$$

21. [출제의도] 등차수열의 합 문제 해결하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d ($d \neq 0$)라 하면

(가)에 의하여

$$\frac{5(2a_1 + 4d)}{2} = 2 \left| \frac{10(2a_1 + 9d)}{2} \right|$$

$$a_1 + 2d = 2 |2a_1 + 9d|$$

(i) $a_1 + 2d = 4a_1 + 18d$ 일 때, $a_1 = -\frac{16}{3}d$

$$a_3 a_6 = \left(-\frac{10}{3}d \right) \times \left(-\frac{d}{3} \right) = \frac{10}{9}d^2 > 0 \text{ 이므로}$$

(나)의 조건을 만족시킨다.

(ii) $a_1 + 2d = -4a_1 - 18d$ 일 때, $a_1 = -4d$

$$a_3 a_6 = (-2d) \times d = -2d^2 < 0 \text{ 이므로}$$

(나)의 조건에 모순이다.

$$\text{따라서 } \frac{a_{21}}{a_1} = \frac{-\frac{16}{3}d + 20d}{-\frac{16}{3}d} = -\frac{11}{4}$$

22. [출제의도] 함수의 극한값 계산하기

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 5) = 2^2 + 5 = 9$$

23. [출제의도] 등비수열 이해하기

$$a_5 = a_2 \times 3^3 = 9 \times 27 = 243$$

24. [출제의도] 등차수열의 성질 이해하기

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta = 24$

등차중항의 성질에 의하여 $k = \frac{\alpha + \beta}{2}$

따라서 $k = 12$

25. [출제의도] 등비수열의 합 이해하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$\sum_{n=1}^5 a_n = \frac{a(2^5 - 1)}{2 - 1} = 310 \text{ 에서 } a = 10$$

$$\text{따라서 } a_7 = 10 \times 2^6 = 640$$

26. [출제의도] 거듭제곱근과 지수법칙 이해하기

정사각형의 넓이가 $\sqrt[3]{64}$ 이므로
 정사각형의 한 변의 길이

$$f(n) = \sqrt[n]{\sqrt[3]{64}} = 2^{\frac{6}{2n}} = 2^{\frac{3}{n}}$$

$$\text{따라서 } f(4) \times f(12) = 2^{\frac{3}{4}} \times 2^{\frac{1}{4}} = 2$$

27. [출제의도] 삼각함수를 활용하여 문제 해결하기

$$\overline{BE} = 1, \overline{EC} = 5 \text{ 이므로}$$

$$\overline{AE} = \sqrt{10}, \overline{AC} = 3\sqrt{5}$$

삼각형 AEC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{10 + 45 - 25}{2 \times \sqrt{10} \times 3\sqrt{5}} = \frac{30}{30\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\text{따라서 } 50 \sin \theta \cos \theta = 25$$

(다른 풀이)

삼각형 AEC의 넓이는


$$\frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times 3\sqrt{5} \times \sin \theta = \frac{15}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$


$$\text{따라서 } 50 \sin \theta \cos \theta = 25$$

28. [출제의도] 로그함수를 활용하여 문제 해결하기



두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 A', B'이라 하자.
삼각형 AOA'과 삼각형 BOB'은 닮음이므로 $\overline{OA'} : \overline{OB'} = \overline{AA'} : \overline{BB'} = 1 : 2$
점 A의 좌표를 $(a, \log_3(5a-3))$ 이라 하면
점 B의 좌표는 $(2a, \log_3(10a-3))$
 $2\log_3(5a-3) = \log_3(10a-3)$
 $25a^2 - 30a + 9 = 10a - 3$
 $25a^2 - 40a + 12 = (5a-2)(5a-6) = 0$ 이므로
 $a = \frac{2}{5}$ 또는 $a = \frac{6}{5}$
 $a > \frac{3}{5}$ 이므로 $a = \frac{6}{5}$
점 A의 좌표는 $(\frac{6}{5}, 1)$
직선 AB의 기울기는 직선 OA의 기울기와 같다.
직선 OA의 기울기 $\frac{q}{p} = \frac{1-0}{\frac{6}{5}-0} = \frac{5}{6}$
따라서 $p+q = 11$

29. [출제의도] 삼각함수를 활용하여 문제 해결하기



원 O_1 의 중심을 O_1 , 원 O_2 의 중심을 O_2 ,
직선 O_1O_2 가 선분 AB와 만나는 점을 M이라 하고
직선 O_1O_2 가 원 O_1 과 만나는 두 점 중에서
점 M에 가까운 점을 N이라 하자.
 $\overline{O_1A} = 6, \overline{AM} = 3\sqrt{2}$
 $\overline{O_1A} : \overline{AM} = \sqrt{2} : 1$ 이므로 $\angle MO_1A = \frac{\pi}{4}$

원 O_1 에서
점 B를 포함하지 않는 부채꼴 O_1NA 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{9}{2}\pi$ ㉠
 $\angle MO_2A = \frac{\pi}{3}$ 이므로 $\overline{O_2A} = 2\sqrt{6}$
원 O_2 에서
점 B를 포함하지 않는 부채꼴 O_2AC 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times (2\sqrt{6})^2 \times \frac{2}{3}\pi = 8\pi$ ㉡
 $\overline{O_1O_2} = \overline{O_1M} - \overline{O_2M} = 3\sqrt{2} - \sqrt{6}$ 이므로
삼각형 AO_1O_2 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 6 \times (3\sqrt{2} - \sqrt{6}) \times \sin \frac{\pi}{4}$
 $= 9 - 3\sqrt{3}$ ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의하여
 $p + q\sqrt{3} + r\pi = 2 \times \left\{ \frac{9}{2}\pi + 8\pi - (9 - 3\sqrt{3}) \right\}$
 $= -18 + 6\sqrt{3} + 25\pi$
따라서 $p+q+r = 13$

30. [출제의도] 수열 추론하기

함수 $f(x) = x^2 + n$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가
만나기 위해서는
이차방정식 $x^2 - mx + n = 0$ 의 판별식
 $D = m^2 - 4n \geq 0$ 에서 $m^2 \geq 4n$
 $n = 1$ 이면 $m^2 \geq 4$ 이므로 $a_1 = 2$
 $n = 2$ 이면 $m^2 \geq 8$ 이므로 $a_2 = 3$
 $n = 3$ 이면 $m^2 \geq 12$ 이므로 $a_3 = 4$
 $n = 4$ 이면 $m^2 \geq 16$ 이므로 $a_4 = 4$

이를 바탕으로 추론하면
 $4 \times 5 < 5^2 < 4 \times 7$ 이므로
 $a_n = 5$ 를 만족시키는 n 은 5, 6
 $4 \times 7 < 6^2 \leq 4 \times 9$ 이므로
 $a_n = 6$ 을 만족시키는 n 은 7, 8, 9
:
 $4 \times 26 < 11^2 < 4 \times 31$ 이므로
 $a_n = 11$ 을 만족시키는
 n 은 26, 27, 28, 29, 30
 $4 \times 31 < 12^2 \leq 4 \times 36$ 이므로
 $a_n = 12$ 를 만족시키는
 n 은 31, 32, 33, 34, 35, 36

 $a_n < a_{n+1}$ 을 만족시키는
33 이하의 모든 n 의 값은
1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30
따라서 모든 n 의 값의 합은 125